

# Halset<sup>®</sup>

## torokspray

30 ml

## Használati útmutató

*Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, mert az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerinti alkalmazása. Amennyiben bizonytalan vagy további kérdési vannak, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.*

### **Mire való a Halset torokspray?**

A szájüreg és a torok nyálkahártyája irritációnak lehet kitéve a hideg, szennyezett illetve száraz belélegzett levegőtől. Mindez eredményezhet rekedtséget, torokfájást vagy nyelési nehézséget, melyek a megfázás első jelei is lehetnek.

A Halset torokspray nedvesíti és ápolja a szájüreg és a torok nyálkahártyáját. Az összetevők védő filmréteget képezve nyugtatják az irritált nyálkahártyát és elősegítik annak regenerációját, ezáltal csökkentve a rekedtség-érzetet, csillapítva a torokfájást és könnyítve a nyelést.

### **Mit tartalmaz a Halset torokspray?**

A Halset torokspray a következő összetevőket tartalmazza: pantenol, benzalkónium-klorid (tartósítószer), anetol, borsmenta olaj, poliszorbát 20, nátrium-ciklamát, propilén-glikol, kálium-foszfát, nátrium-foszfát, tisztított víz.

1 bepermeterezett adag 0,14 ml oldatnak felel meg.

### **Kíszerelés**

30 ml oldat

A Halset torokspray alkohol- és cukormentes, valamint pH semleges készítmény.

### **Mit kell tudni a Halset torokspray alkalmazásának megkezdése előtt?**

#### **Ne alkalmazza a Halset toroksprayt**

- bármely összetevővel szembeni túlérzékenység esetén,
- 3 éves életkor alatti gyermekek esetében, mivel fennáll az oldat lenyelésének a veszélye.

#### **Egyéb készítmények és a Halset torokspray**

A Halset torokspray előírásnak megfelelő használata esetén nincs ismert kölcsönhatás más készítményekkel/gyógyszerekkel.

#### **Terhesség és szoptatás**

Az eddigi tapasztalatok alapján az előírásnak megfelelő használat esetén a készítmény nem jelent kockázatot a gyermekekre nézve. Ennek ellenére a Halset torokspray alkalmazása terhesség és szoptatás időszakaiban elővigyázatosságból nem javasolt.

#### **Egyéb fontos tudnivalók**

Magas lázzal, fejfájással, émelygéssel vagy hányással kísért, illetve több mint 2 napig fennálló súlyos torokgyulladás vagy torokfájás esetén keresse fel kezelőorvosát.

#### **Túladagolás**

Nagyobb mennyiségű oldat lenyelése émelygést és hányást okozhat.

## **Hogyan kell alkalmazni a Halset toroksprayt?**

### Adagolás:

Permetezze az oldatot a szájüreg toroktájékára, igény szerint naponta többször (kb. 2 óránként).

A készítmény hígítatlan formában használható.

### Felnőttek:


maximum 4 bepermetezés/alkalom

### Gyermekek (3–15 éves kor):

maximum 2 bepermetezés/alkalom

### Alkalmazás:

Óvatosan hajtsa ki oldalirányba az adagolócsövet (a rajzon jelölt módon, a nyilat követve).



A Halset torokspray első alkalmazását megelőzően többször pumpálja a levegőbe, amíg az adagoló feltöltődik és egyenletes permet keletkezik.

Írányítsa az adagolót a szájüreg toroktájéka felé és nyomja meg a pumpát, miközben az üveget függőlegesen tartja. Használat után, hajtsa vissza az adagolót az eredeti pozíciójába.

Higiéniai okokból és az esetleges fertőzések elkerülése végett a Halset toroksprayt csak egy személy használja.

## **Milyen mellékhatások fordulhatnak elő az alkalmazás során?**

A Halset torokspray bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén előfordulhatnak allergiás reakciók.

Hosszantartó használat esetén alkalmanként vagy átmenetileg hosszabb időre is ízérzékszavar léphet fel.

A Halset torokspray használata során felmerülő, ebben a tájékoztatóban nem említett mellékhatások előfordulása esetén kérjük, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

## **Hogyan kell tárolni a Halset toroksprayt?**

A készítményt csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni. Legfeljebb szobahőmérsékleten (25 °C) tárolandó.

A fénytől való védelem érdekében az üveget az eredeti dobozban tárolja.

A készítmény gyermekektől elzárva tartandó.

### **Gyártó**

Gebro Pharma GmbH

A-6391 Fieberbrunn, Bahnhofbichl 13.

Ausztria

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a gyártó helyi képviselőjéhez:

Sager Pharma Kft.,

H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Tel.: 06-1-214-6559



Orvostechikai eszköz –  
gyógyászati segédeszköz

A használati útmutató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2012. február