

# Használati útmutató

## CARREVIR® orrspray

### Milyen típusú készítmény a Carrevir orrspray?

A Carrevir egy orrspray, mely védő filmbevonatot képez az ornyálkahártyán a megfázást okozó vírusok ellen, ezáltal a szervezet természetes védekezését támogatja.

A Carrevir vírus okozta influenzaszerű megbetegedések megelőzésének, illetve kezelésének támogatására ajánlott.

Emellett a Carrevir az ornyálkahártya kiszáradásának megelőzésére, illetve fenntartó nedvesítésére is alkalmazható.

Használata felnőttek és egy éven felüli gyermekek számára javasolt.

A Carrevir **tartósítószer-mentes** készítmény. Steril szűrő biztosítja az oldat tisztaságát még többszöri használat után is.

### Mit tartalmaz a Carrevir orrspray?

A Carrevir orrspray átlátszó, színtelen, viszkózus (sűrűn folyós), szagtalan oldat.

Összetétel (1 ml oldat): 1,2 mg jóda-karragén (Carragelose®), 0,4 mg kappa-karragén, nátrium-klorid, tisztított víz.

### Mi jellemzi a Carrevir orrspray-t?

A közönséges náthát legtöbbször vírusok okozzák. Ezek a vírusok leggyakrabban az orrüregben keresztül fertőznek. Ha a vírusok bejutnak az orrüregbe, megtapadnak a nyálkahártyán és megfertőzik a nyálkahártya sejtjeit, ahol szaporodnak és elterjednek. Ez pedig a szokásos megfázásos tüneteket eredményezi: orrdugulás vagy orrfolyás, torokfájás és/vagy fejfájás, köhögés stb. A betegség kezdeti fázisában gyakran nehéz biztonsággal különbséget tenni a megfázás és az influenza között. Ez utóbbi akár súlyos megbetegedést is okozhat, ezért a pontos diagnózis felállításához kérjen orvosi segítséget.

Az ornyálkahártya fiziológiai nedvessége támogatja a test természetes védekezését a vírusokkal és a környezeti hatásokkal szemben. Az orr szűrő funkcióját – azt a képességét, hogy a belélegzett levegőből visszatartja a szilárd (vírus, por, stb.) részecskéket – csak jól működő és egészséges csillós hámmal beborított és nedvesen tartott ornyálkahártya segítségével tudja ellátni.

Az ornyálkahártya kiszáradását és irritációját okozhatja a levegő szennyezettsége vagy gyakori tartózkodás alacsony relatív páratartalmú helyiségekben, mint például fűtött vagy légkondicionált szobák, autó, vonat vagy repülőgép. Mindkét tényező – a levegő szennyezettsége és alacsony páratartalma – okozhatja az ornyálkahártya kiszáradását.

A Carrevir Carragelose®-t, tengeri vörös algából nyert hatóanyagot tartalmaz. A Carragelose® kettős hatással rendelkezik:

- A Carrevir egy védő bevonatot képez a megfázást okozó vírusok ellen. Közönséges megfázást és influenzaszerű megbetegedéseket számos vírus okozhat, mint például a rinovírus és a koronavírus. A Carragelose® beburkolja ezeket a vírusokat, így megakadályozva azok nyálkahártyához történő tapadását. Ezáltal csökkenti a légutak fertőzéséért felelős vírusok szaporodását és terjedését. **Az influenzaszerű betegségeket okozó vírusokhoz hasonlóan a Carragelose® nem specifikus, vírusokat csapdába ejtő tulajdonsága laboratóriumi körülmények között a SARS-CoV-2 esetében is kimutathatónak bizonyult. Így a Carrevir, még ha nem is tudja a SARS-CoV-2 által okozott fertőzést teljesen megelőzni, a vírusterjedés és a fertőzés kockázatát jelentősen csökkentheti.**
- A Carrevir orrspray egy védő nedvesítő filmréteget képez az ornyálkahártyán. A Carragelose® hatásának köszönhetően ez a filmréteg hosszú ideig megmarad az orr nyálkahártyáján és fizikai akadályt képez a külső behatásokkal szemben. Ez a nedves filmréteg támogatja a szervezet természetes védekezését a felső légutakat megfertőző vírusok ellen.

### Alkalmazási területek – Mikor ajánlott a Carrevir orrspray használata?

A Carrevir vírus okozta légúti fertőzések megelőzésére, illetve támogató kezelésére ajánlott.

**A Carrevir orrspray lerövidíti az influenzaszerű megbetegedések lefolyási idejét és enyhíti a megfázásos tünetek súlyosságát. A Carrevir csökkenti az új fertőzések kialakulását, valamint a vírus okozta megfázásos tünetek kiújulását.**

Emellett a Carrevir az orrnyálkahártya kiszáradásának megelőzésére, illetve fenntartó nedvesítésére, ezáltal a száraz vagy irritált orrnyálkahártya okozta panaszok megelőzésére és támogató kezelésre is alkalmazható.

## **Adagolás és az alkalmazás módja**

### **Hogyan és milyen gyakran kell alkalmazni a Carrevir orrspray-t?**

A megfázás első tüneteinek (pl.: torokfájás, orrvizketés vagy orrfolyás stb.) megjelenésekor legalább napi három befújás javasolt orrnyílásonként. A kezelést a megfázás első tüneteinek megjelenése után a lehető leghamarabb el kell kezdeni és a tünetek csillapodásáig javasolt folytatni. Amennyiben a panaszok egy hét után sem enyhülnek, illetve láz esetén forduljon orvoshoz.

Az orrnyálkahártya nedvesen tartásához napi néhány befújás javasolt, az egyedi igényeknek megfelelően.

- A készítmény első alkalmazása előtt vegye le a védőkupakot és szükség szerint nyomja le többször az adagolópumpát, amíg egyenletes permet nem távozik belőle. Ezt követően a Carrevir orrspray készen áll a használatra.
- A sérülések megelőzése érdekében az adagolópumpát óvatosan vezesse az orrüregbe. Használat közben a tartályt tartsa függőlegesen.
- Használat után helyezze vissza a védőkupakot az adagolópumpára.

### **Mikor NE alkalmazza a Carrevir orrspray-t?**

Amennyiben ismert túlérzékenysége van a készítmény bármely összetevőjére.

### **Lehetséges mellékhatások**

Ez idáig a nagyon ritkán előforduló túlérzékenységi reakciókon kívül, mint például orrvérzés a készítmény egyéb mellékhatásai nem ismertek.

Gyógyszerkölcsonhatások nem ismertek.

Egyéb készítményekkel történő kölcsönhatásokra vonatkozó vizsgálatokat nem végeztek.

### **Különleges figyelmeztetések**

A Carrevir helyileg fejti ki hatását, a Carragelose® nem szívódik fel az orrnyálkahártya sejtein keresztül.

A Carrevir orrspray terhesség és szoptatás alatt is használható.

A tünetek huzamosabb fennállása esetén mindenképpen keresse fel orvosát.

Ha a Carrevir használata során bármilyen mellékhatást tapasztalna, kérjük forduljon egészségügyi szakemberhez, és jelentse az információt a helyi forgalmazónak, a gyártónak, vagy a helyi egészségügyi hatóságnak.

Higiéniai okokból, illetve a fertőzések terjedésének elkerülése érdekében egyazon orrspray tartályt mindig csak egy és ugyanaz a személy használja.

A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!

### **További információk**

A Carrevir orrspray hosszabb ideig is használható. Nem áll fenn a függőség vagy a túladagolás kockázata.

A Carrevir klinikailag vizsgált orvostechikai eszköz/gyógyászati segédeszköz.

A Carrevir nem rendelkezik orrdugulás elleni hatással.

A Carrevir nem tartalmaz fájdalomcsillapítót/érsztelenítőt, tartósítószeret, állati eredetű összetevőt vagy üvegházhatású gázokat.

A Carrevir laktóz- és gluténmentes, cukorbeteg is használhatja.

## **Csomagolás**

20 ml oldat adagolópumpával ellátott 20 ml-es üvegtartályban; 1 befűjás = 0,14 ml oldat (összesen 142 befűjás).

## **Eltarthatóság**

Gyártástól számított 36 hónap.

A különleges szűrőrendszernek köszönhetően az oldat többszöri használat után is megőrzi sterilitását.

A Carrevir a dobozon vagy a címkén jelzett időpontig használható.

## **Tárolási előírás**

Fénytől védve, 5°C és 30°C között tárolandó.

## **Gyártó**

Hälsa Pharma GmbH

Maria-Goeppert-Strasse 5, D-23562 Lübeck, Németország

## **Forgalmazó**

Sager Pharma Kft., 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

**A használati útmutató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2020. augusztus**

CE 0482

STERILE A

Orvostechnikai eszköz, amely egyben gyógyászati segédeszköznek is minősül.